

# Matematica generale CLEII, 19 settembre 2018

Maurizio Parton

Tutte le risposte devono essere adeguatamente motivate.

L'esercizio 1 va svolto *perfettamente* prima di passare agli altri.

In presenza di errori nell'esercizio 1 il compito verrà considerato *insufficiente*.

1. Dati gli insiemi  $A = \{x \in \mathbb{R} \text{ tale che } \cos(x^9 + 2x - 4) \in [-1, 1]\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} \text{ tale che } x^2 + 1 \leq 5\}$  e  $C = \{x \in \mathbb{R} \text{ tale che } x \text{ è negativo}\}$ , determinare:

- $A \setminus C$ ;
- $(A \setminus C) \cap B$ ;
- $\mathbb{R} \setminus (A \cap B)$ ;
- $(\mathbb{R} \setminus A) \cup (\mathbb{R} \setminus B)$ .

Suggerimento: aiutarsi con la rappresentazione dei numeri sulla retta reale.

2. Partendo dal grafico della funzione elementare  $y = \sqrt{x}$ , disegnare il grafico della funzione  $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$  senza fare lo studio di funzione. Usare poi il grafico trovato per determinare *in maniera grafica* dominio e immagine di  $f$ .
3. Disegnare il grafico della seguente funzione:

$$f(x) := \frac{1}{1+x}$$

4. Trovare una funzione  $f(x)$  la cui derivata  $f'(x)$  è  $(1 + e^x)^2$ .

5. Data  $f(x)$  tramite il grafico in figura 1, determinare:

- campo d'esistenza  $D$ ;
- punti di  $D$  in cui  $f$  è continua/discontinua;
- zeri e intersezioni con gli assi;
- segno e monotonia;
- estremi locali e globali;
- punti di  $D$  in cui  $f$  non è derivabile;
- punti di  $D$  in cui la funzione cambia concavità.




Figura 1: Determinare proprietà della funzione che genera questo grafico

**Girare pagina, c'è un ultimo esercizio!**

6. Si considerino il dominio in  $\mathbb{R}^2$  dato da  $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tale che } x^2 - 1 \leq y \leq 3\}$  e la funzione

$$f(x, y) = e^{xy}$$

- (a) Dire se esiste un massimo e/o un minimo assoluto di  $f$  sul bordo  $\partial D$  di  $D$ , ed eventualmente trovarli.
- (b) Trovare i punti stazionari di  $f$  nei punti interni  $\overset{\circ}{D}$  di  $D$ .
- (c) Calcolare la matrice Hessiana  $\mathcal{H}_f(0, 0)$  di  $f$  nel punto  $(0, 0)$ .
- (d) Calcolare gli autovalori di  $\mathcal{H}_f(0, 0)$ .
- (e) Usare (6c) per dire se  $(0, 0)$  è un punto di massimo, di minimo o di sella, *senza usare gli autovalori*.
- (f) Usare gli autovalori calcolati in (6d) per dire se  $(0, 0)$  è un punto di massimo, di minimo o di sella.
- (g) Usare (a), (b), (c) e (d) per calcolare i massimi e i minimi assoluti di  $f$  nel dominio  $D$ .

**Fine del compito :-)**